



Gibbula (*Colliculus*) *adriatica* (Philippi, 1844)

Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda Cuvier, 1797
Ordo	Vetigastropoda Salvini-Plawen & Haszprunar, 1987
Superfamiglia	
Familia	Trochidae Rafinesque, 1815
Subfamiglia	
Genus	<i>Gibbula</i> Risso, 1826 ex Leach ms.
Subgenus	(<i>Colliculus</i>) Monterosato, 1888
specie	<i>adriatica</i> (Philippi, 1844) [Trochus]
subspecie	

Scheda descrittiva:	
Sinonimi	? <i>Turbo angulatus</i> Eichwald, 1829 = <i>Turbo cremensis</i> Andrzejewsky, 1832 = <i>Trochus varians</i> Deshayes, 1835 = <i>Trochus olivaceus</i> Anton, 1839 = <i>Trochus abrodiaetus</i> Nardo, 1847 -: ex Chiereghini ms. ! <i>Trochus cinerarius</i> Linné, 1758 -- - sensu Nardo, 1847 ? <i>Trochus basteroti</i> Hoernes, 1848 -: ex Partsch ms. = <i>Gibbula adriatica</i> var. <i>tunetana</i> Pallary, 1914
Descrizione	Conchiglia di forma conica, slanciata, moderatamente scalariforme. La scultura è costituita da finissimi solchi spirali, poco visibili lungo i fianchi, appena più percettibili sulla base, separati da interspazi larghi più del doppio dei cingoli. Un particolare morfologico caratteristico è costituito dall'ombelico che è aperto e rotondo, ma piccolo e compreso fra pareti ripide. Questa specie presenta un certo grado di variabilità. La colorazione è data da flammule brune su fondo beige; il numero, le dimensioni ed il tono delle flammule possono variare tanto da rendere molto diversi gli esemplari. La colorazione della base della conchiglia è invece abbastanza omogenea tra i diversi esemplari, e risulta tessellata per la disposizione delle macchie brune che si alternano a quelle chiare lungo le fasce spirali.
Dimensioni	La misura media è di 9-12 mm.
Area di distribuzione e habitat	Endemica dell'Alto Adriatico, ove è ampiamente diffusa e talvolta abbondante. Vive in aree riparate, con presenza di alghe e su substrato duro nella fascia intertidale.
Descrizione originale	
Riferimenti bibliografici	
Riferimenti on line	http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5967 http://www.lavalledelcesano.it/ http://www.liceofoscarini.it/
Comparazione	Trochide molto simile a <i>G. adansoni</i> e per questo per lungo tempo considerata una sua variante. Differisce da questa per le dimensioni leggermente maggiori e per le linee di sutura meno profonde. <i>Gibbula adriatica</i> ha l'ultimo giro con periferia angolosa, mentre in <i>Osilinus</i> è arrotondata. Inoltre nelle <i>Gibbula</i> manca la nodulosità sporgente alla columella tipica degli <i>Osilinus</i> .
Note	
Redattore	Scheda di Maria Amato aggiornata al 27/05/2007

Riferimenti fotografici:		
		
Foto 1 di Sergio Lazzarotto		