



# *Osilinus turbinatus* (Von Born, 1778)

Scheda tassonomica:	
<b>Classis</b>	Gastropoda Cuvier, 1797
<b>Ordo</b>	Archeogastropoda Thiele, 1925
<b>Superfamilia</b>	Trochoidea Rafinesque, 1815
<b>Familia</b>	Trochidae Rafinesque, 1815
<b>Subfamilia</b>	
<b>Genus</b>	<i>Osilinus</i> Philippi, 1847
<b>Subgenus</b>	
<b>specie</b>	<i>turbinatus</i> (Von Born, 1778)
<b>subspecie</b>	

Scheda descrittiva:	
<b>Sinonimi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= Trochus tessulatus Born, 1778</li> <li>? Trochus tessellatus Gmelin, 1791</li> <li>= Monodonta fragaroides Lamarck, 1822</li> <li>= Monodonta olivieri Payraudeau, 1826</li> <li>= Trochus zonatus Jeffreys, 1856</li> <li>= Trochus skeneoides Jeffreys, 1856</li> <li>= Trochus turbinatus var. elongata Bucquoy, Dautzenberg &amp; Dollfus, 1884</li> <li>= Trochus turbinatus var. globosa Bucquoy, Dautzenberg &amp; Dollfus, 1884</li> <li>= Trochus turbinatus var. major Bucquoy, Dautzenberg &amp; Dollfus, 1884</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. zebra Bucquoy, Dautzenberg &amp; Dollfus, 1885</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. concava Monterosato, 1888</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. conspicua Monterosato, 1888</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. dilatata Monterosato, 1888</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. elevata Monterosato, 1888</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. lapillus Monterosato, 1888</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. pinguis Monterosato, 1888</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. ponderosa Monterosato, 1888</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. maxima Monterosato, 1889</li> <li>= Trochocochlea turbinata var. interrupta Pallary, 1912</li> <li>= <i>Osilinus turbinatus orientalis</i> Nordsieck, 1974</li> </ul>
<b>Descrizione</b>	<p>Conchiglia comunissima, di taglia media o anche piccola, molto solida, a spira conica moderatamente elevata, con anfratti convessi, sutura incisa poco marcata; la base è appiattita sempre priva di ombelico. La scultura è data da cingoli spirali che divengono più larghi e depressi di giro in giro; la base è percorsa da sette o nove larghi cordoni concentrici. Le strie di accrescimento sono sottili e generalmente poco evidenti. La columella è provvista, nella parte mediana, di un dente moderatamente esteso ma poco rilevato con dei bei riflessi perlacei. Il labbro esterno è tagliente. La colorazione di fondo permette di riconoscerla facilmente dalle congeneri: ha una base bianca, giallastra o anche verdognola (specialmente negli esemplari giovanili), con una serie di macchie rosse, brune, viola o anche nerastre presenti su ogni cordone spirale ad intervalli regolari. Ha un opercolo corneo di colore giallo.</p>
<b>Dimensioni</b>	20/25mm
<b>Area di distribuzione e habitat</b>	<p><i>Distribuzione:</i> La specie si può rinvenire facilmente in tutto il Mediterraneo, ad esclusione del mar Nero; in Atlantico si limita a lambire le coste meridionali del Portogallo e quelle settentrionali del Marocco.</p> <p><i>Habitat:</i> Vive nel piano mesolitorale. Predilige ambienti rocciosi con moto ondososo sostenuto.</p>
	
<b>Descrizione originale</b>	
<b>Riferimenti bibliografici</b>	- B. Sabelli – 2001 – Conchiglie – Ed. Orsa Maggiore – pp. 190
<b>Riferimenti on line</b>	<a href="http://digilander.libero.it/conchiglienevaneziane/gasteropodi/specie/OsilinusTurbinatus.htm">http://digilander.libero.it/conchiglienevaneziane/gasteropodi/specie/OsilinusTurbinatus.htm</a>

[www.gastropods.com/2/Shell\\_2212.html](http://www.gastropods.com/2/Shell_2212.html)  
<http://www.mondomarino.net/ricerca/index.asp?view=dett&q=&p=13&cat=22&f=16>

**Comparazione**

**Note**

**Redattore** Scheda di Marco Sanniu – aggiornata al 24/06/2007

**Riferimenti fotografici:**



Foto 1 di Claudio Fanelli




Foto 2 di Sergio Lazzarotto