




# *Tricolia speciosa* Von Muehlfeldt, 1824

Scheda tassonomica:	
<b>Classis</b>	Gastropoda Cuvier, 1797
<b>Ordo</b>	Vetigastropoda Salvini-Plawen & Haszprunar, 1987
<b>Superfamiglia</b>	
<b>Familia</b>	Turbinidae Rafinesque, 1815
<b>Subfamiglia</b>	
<b>Genus</b>	<i>Tricolia</i> Risso, 1826
<b>Subgenus</b>	
<b>specie</b>	<i>speciosa</i> (Von Muehlfeldt, 1824) [Turbo]
<b>subspecie</b>	

Scheda descrittiva:	
<b>Sinonimi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= <i>Tricolia nicaensis</i> Risso, 1826</li> <li>= <i>Tricolia rubra</i> Risso, 1826</li> <li>= <i>Turbo vieuxi</i> Payraudeau, 1826</li> <li>= <i>Phasianella ferussaci</i> Guerin, 1829</li> <li>= <i>Phasianella lymnaeoides</i> Anton, 1839</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>albina</i> Monterosato, 1880</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>lactea</i> Monterosato, 1880</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>maculata</i> Monterosato, 1880</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>major</i> Monterosato, 1880</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>normalis</i> Monterosato, 1880</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>spirolineata</i> Monterosato, 1880</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>viridis</i> Monterosato, 1880</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>aurea</i> Dautzenberg, 1882</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>atrata</i> Dautzenberg, 1883</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>purpurea</i> Dautzenberg, 1883</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>atra</i> Bucquoy, Dautzenberg &amp; Dollfus, 1884</li> <li>= <i>Phasianella speciosa</i> var. <i>sanguinea</i> Bucquoy, Dautzenberg &amp; Dollfus, 1884</li> <li>= <i>Tricolia speciosa</i> var. <i>seriopunctata</i> Monterosato, 1884</li> <li>= <i>Tricolia speciosa</i> var. <i>virescens</i> Monterosato, 1884</li> <li>= <i>Tricolia rentneri</i> Nordsieck, 1973</li> </ul>
<b>Descrizione</b>	<p>Conchiglia di piccola taglia, leggera, fragile, con spira conica molto elevata tanto che l'altezza giunge ad essere più del doppio della larghezza. I giri sono regolarmente arrotondati, sutura molto profonda. Lo stoma è moderatamente obliquo rispetto all'asse della conchiglia. Il labbro è sottile e tagliente. È priva di periostraco e di scultura, per cui la superficie è liscia e lucente. Come tutte le <i>Tricolia</i> maggiori non possiede ombelico. La colorazione e il disegno sono molto variabili. A fianco di forme bianche, arancioni, rosse o marroni uniformi, si trovano, molto più comunemente, esemplari con disegni dati da linee o fasce perpendicolari di colore bianco o marrone, ad andamento zigzagante. L'opercolo calcareo è ovoidale con la parte superiore appuntita, di colore bianco, leggermente convesso, a nucleo eccentrico.</p>
<b>Dimensioni</b>	L'altezza media è di 13 mm. Fra le <i>Tricolia</i> mediterranee <i>speciosa</i> è quella che ha le dimensioni maggiori potendo raggiungere anche i 14 mm di altezza massima.
<b>Area di distribuzione e habitat</b>	<p>È specie della provincia lusitanica distribuita in tutto il Mediterraneo. Vive quasi esclusivamente sulle foglie di posidonia, raramente sulle alghe, nel piano infralitorale. È specie esclusiva del Mediterraneo.</p>
	
<b>Descrizione originale</b>	
<b>Riferimenti bibliografici</b>	- G. D'Angelo, S. Gargiulo, Guida alle conchiglie mediterranee 1978, p. 93

	<p>- Conchiglie Bruno Sabelli scheda n. 331          - Giannuzzi - Savelli, Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo, vol.1 1997 p. 114</p>
<b>Riferimenti on line</b>	<p><a href="http://www.gastropods.com/2/Shell_2472.html">http://www.gastropods.com/2/Shell_2472.html</a>  <a href="http://www.conchology.be/en/cyberconchology/newcyber/searchresults.php?d=s&amp;family=PHASIANELLIDAE&amp;species2=Tricolia%20speciosa&amp;family2=PHASIANELLIDAE">http://www.conchology.be/en/cyberconchology/newcyber/searchresults.php?d=s&amp;family=PHASIANELLIDAE&amp;species2=Tricolia%20speciosa&amp;family2=PHASIANELLIDAE</a>  <a href="http://marenostrum.org/vidamarina/animalia/invertebrados/moluscos/malacologia/phasianellas/">http://marenostrum.org/vidamarina/animalia/invertebrados/moluscos/malacologia/phasianellas/</a>  <a href="http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32770&amp;whichpage=3">http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32770&amp;whichpage=3</a>  <a href="http://www.sim-online.it/Risorse/moll_vivi/Gastropoda%20marini/Gastropoda%20marini.htm">http://www.sim-online.it/Risorse/moll_vivi/Gastropoda%20marini/Gastropoda%20marini.htm</a>  <a href="http://www.wretch.cc/album/show.php?i=PJWang&amp;b=95&amp;f=1128748036&amp;p=3">http://www.wretch.cc/album/show.php?i=PJWang&amp;b=95&amp;f=1128748036&amp;p=3</a>  <a href="http://www.carlesdorado.com/index.php?option=com_zoom&amp;Itemid=29&amp;page=view&amp;catid=93&amp;PageNo=1&amp;key=2&amp;hit=1">http://www.carlesdorado.com/index.php?option=com_zoom&amp;Itemid=29&amp;page=view&amp;catid=93&amp;PageNo=1&amp;key=2&amp;hit=1</a>  <a href="http://www.femorale.com.br/shellphotos/detail.asp?species=Tricolia+speciosa+(von+Muhlfeldt%2C+1824)">http://www.femorale.com.br/shellphotos/detail.asp?species=Tricolia+speciosa+(von+Muhlfeldt%2C+1824)</a>  <a href="http://www.sportesport.it/shellsGA25.htm">http://www.sportesport.it/shellsGA25.htm</a>  <a href="http://sub-vidayfoto.com/principal.asp">http://sub-vidayfoto.com/principal.asp</a></p>
<b>Comparazione</b>	
<b>Note</b>	<p>Il mollusco è di un bel colore verde pisello, ha il piede lungo e sottile con una plica laterodorsale (epipodio) provvista di lunghi cirri. Il capo distinto porta due lunghi tentacoli. Ha una sola branchia e un solo osfradio. La radula è ripidoglossa con un dente rachidiano largo ma privo di cuspidi.</p>
<b>Redattore</b>	Scheda di Maria Amato aggiornata al 2 giugno 2007

<b>Riferimenti fotografici:</b>		
		
Foto 1 di Sergio Lazzarotto	Foto 2 di Sergio Lazzarotto	Foto 3 di Claudio Fanelli
		
Foto 4 di Aldo Marinelli		